Las personas con glaucoma pierden gradualmente visión periférica (lateral) conforme empeora la enfermedad y, en algunos casos, se produce pérdida de la visión central.



Pérdida de visión periférica (lateral)



Pérdida de visión central

De no tratarse, podría ocasionar una discapacidad visual y, a la larga, ceguera.

¿Qué es la hipertensión ocular?

- La hipertensión ocular se produce cuando no se drena adecuadamente el líquido del ojo, lo que provoca una presión ocular más elevada de lo normal
- Las personas diagnosticadas de hipertensión ocular no presentan signos ni síntomas, por lo que deben estar bajo la atenta supervisión de un optometrista o un oftalmólogo, ya que pueden tener un mayor riesgo de padecer glaucoma

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Evite que la punta del envase entre en contacto con el ojo o cualquier otra superficie, como el dedo, para evitar que la solución se contamine con bacterias. El uso de una solución contaminada podría causar daños graves a los ojos e incluso pérdida de visión.

Consulte más información importante de seguridad en este documento y en la versión completa de la Posología e indicaciones de uso introducidas en la solapa.

AHORRE EN SU TRATAMIENTO

¿Tiene Medicare Part D?

Actualmente, **casi el 77 %* de los pacientes** con Medicare tienen VYZULTA cubierta.

*Según datos de marzo de 2025. Hasta el 76,7 % de los pacientes con Medicare Part D pueden tener cobertura.

A quienes reúnen las condiciones del programa «Extra Help», VYZULTA les cuesta unos $12 o menos.

Si recibe asistencia en Medicare o Medicaid, tiene derecho a acogerse al programa «Extra Help».

Los pacientes con seguro médico privado que cumplen los requisitos† pueden pagar tan solo **$25 de copago por hasta 90 días de tratamiento** en su primera receta y las renovaciones correspondientes.

Únicamente en las farmacias independientes que participan en el programa. En las que no participan, puede que los pacientes con seguro privado elegibles solo tengan que abonar un copago de $35.

† Se aplican términos, condiciones y limitaciones. Consulte los criterios de selección y los términos y condiciones en BauschAccessProgram.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Los efectos secundarios que más se observaron en los estudios son enrojecimiento de los ojos, irritación ocular, dolor ocular y molestias tras aplicar el colirio.

Si la medicación recetada le provoca efectos secundarios, informe a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

INDICACIÓN

VYZULTA® (solución oftálmica de latanoprosteno bunod), 0,024 %, se utiliza para reducir la presión intraocular (de los ojos) en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular.

BAUSCH + LOMB

©2025 Bausch + Lomb. VYZ.0042.USA.25

VYZULTA®
(latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%

SPANISH
ESPAÑOL

VYZULTA®
(latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%



Tome las
RIENDAS
de su salud

Paciente ficticio.



SU VISIÓN. SU VYZULTA.

Reduzca la presión ocular provocada por el glaucoma de ángulo abierto o la hipertensión ocular

*Consulte la versión completa de la Posología e indicaciones de uso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- El iris puede volverse marrón o adquirir un tono más amarronado de forma temporal o permanente. También la piel del párpado puede oscurecerse, lo cual suele revertir al suspenderse el tratamiento con VYZULTA.

Consulte más información importante de seguridad en este documento y en la versión completa de la Posología e indicaciones de uso introducidas en la solapa.

LA PRESIÓN OCULAR EXPLICADA

¿Qué es el glaucoma de ángulo abierto?

- El glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad que provoca la pérdida gradual de visión y, en ocasiones, puede derivar en ceguera
- Se produce cuando el líquido de uno o ambos ojos no se drena adecuadamente
- Ello produce un aumento de la presión y puede dañar el nervio óptico

El glaucoma se conoce como el ***ladrón silencioso de la vista*** debido a que no se aprecian síntomas hasta que el daño es considerable. Por tanto, **es esencial detectarlo temprano y hacerse revisiones oftalmológicas con regularidad para proteger la visión.** Aunque el glaucoma es incurable e irreversible, reducir la presión ocular puede ayudar a conservar la visión.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Las pestañas pueden sufrir cambios graduales, como hacerse más largas o gruesas, cambiar de color, aumentar en cantidad y/o crecer en otra dirección. Estos cambios pueden alterar el aspecto de los ojos. Estos cambios suelen revertir tras suspenderse el tratamiento con VYZULTA.



Paciente ficticio.

VYZULTA®

(latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%

¿Qué es VYZULTA?

- VYZULTA es un colirio que puede disminuir la presión ocular de las personas con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular
- Al disminuir la presión ocular, puede reducir el riesgo de pérdida de visión debido al glaucoma

Acuda regularmente al oftalmólogo y aplíquese VYZULTA una vez al día, por la noche, según lo prescrito, para protegerse la vista

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Informe a su médico de inmediato si nota algún cambio en el ojo, desarrolla alguna enfermedad ocular, advierte cambios repentinos en la visión, sufre algún efecto secundario en los ojos o le van a operar de los ojos.
- Antes de aplicarse VYZULTA, quítese las lentillas. Puede volver a ponerse las lentillas después de 15 minutos.

Use VYZULTA diariamente según lo prescrito

VYZULTA puede disminuir la presión ocular, cosa que resulta de gran importancia para controlar el glaucoma o la hipertensión ocular. **Utilizar VYZULTA según las indicaciones puede ayudarle a alcanzar los objetivos de su tratamiento.**

No existe un equivalente genérico de VYZULTA. **Si la farmacia le sugiere otro producto, ha de saber que será diferente a VYZULTA.** Si está agotado, solicite que se lo encarguen al mayorista.

¿Le preocupa el enrojecimiento de los ojos?

Algunos tratamientos de glaucoma pueden enrojecer mucho los ojos, en cuyo caso se suspenden.

En los ensayos clínicos, **VYZULTA ofreció un bajo índice de enrojecimiento ocular, y menos del 1 % de los pacientes dejaron de utilizarlo debido a efectos secundarios.**

Más información en VYZULTA.com

Escanee el código QR o visite VYZULTA.com para obtener consejos sobre el tratamiento, recursos y descuentos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Si utiliza otro colirio además de VYZULTA, espere 5 minutos entre uno y otro.

Consulte más información importante de seguridad en este documento y en la versión completa de la Posología e indicaciones de uso introducidas en la solapa.

Source	Translation	Back Translation
Contents	Contenido	Contents
©2025 Bausch + Lomb.	©2025 Bausch + Lomb.	©2025 Bausch Lomb.
VYZ.0042.USA.25	VYZ.0042.USA.25	VYZ.0042.USA.25
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (continued)
The most common side effects seen in studies were eye redness, eye irritation, eye pain, and pain after putting the drops in your eye.	Los efectos secundarios que más se observaron en los estudios son enrojecimiento de los ojos, irritación ocular, dolor ocular y molestias tras aplicar el colirio.	The most common side effects observed in the studies were eye redness, irritation, pain and discomfort after applying the eye drops.
You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA.	Si la medicación recetada le provoca efectos secundarios, informe a la FDA.	If your prescription medication causes side effects, report them to the FDA.
Visit www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088	Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.	Visit www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088.
INDICATION	INDICACIÓN	INDICATION
VYZULTA® (latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%, is used to lower intraocular (eye) pressure in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension.	VYZULTA® (solución oftálmica de latanoprosteno bunod), 0,024 %, se utiliza para reducir la presión intraocular (de los ojos) en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular.	VYZULTA® (latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%, is used to reduce intraocular (eye) pressure in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension.
† Terms, conditions, and limitations apply.	† Se aplican términos, condiciones y limitaciones.	† Terms, conditions and limitations apply.
Please see eligibility criteria and terms and conditions at BauschAccessProgram.com.	Consulte los criterios de selección y los términos y condiciones en BauschAccessProgram.com.	Consult the selection criteria and terms and conditions at BauschAccessProgram.com.
Eligible† commercially insured patients may pay as little as a $25 copay for up to a 90-day supply for first Rx and eligible refills.	Los pacientes con seguro médico privado que cumplen los requisitos† pueden pagar tan solo $25 de copago por hasta 90 días de tratamiento en su primera receta y las renovaciones correspondientes.	Patients with private health insurance that meet the requirements† can pay a co-payment as little as $25 for up to 90 days of treatment in their first prescription and any applicable refills.
Exclusively at participating independent pharmacies.	Únicamente en las farmacias independientes que participan en el programa.	Only at independent pharmacies participating in the program.
At non-participating pharmacies, eligible commercial patients may pay as little as a $35 copay.	En las que no participan, puede que los pacientes con seguro privado elegibles solo tengan que abonar un copago de $35.	Eligible patients with private insurance may only have to pay a $35 co-pay at non-participating pharmacies.
Those who qualify for the "Extra Help" Program pay about $12 or less for VYZULTA	A quienes reúnen las condiciones del programa «Extra Help», VYZULTA les cuesta	VYZULTA costs about $12 or less for patients who qualify for the Extra Help program.

	unos $12 o menos.	
If you are enrolled in Medicare and Medicaid, you already qualify for the “Extra Help” Program	Si recibe asistencia en Medicare o Medicaid, tiene derecho a acogerse al programa «Extra Help».	You are eligible for the "Extra Help" program if you receive assistance with Medicare or Medicaid.
* Based on data from March 2025.	* Según datos de marzo de 2025.	* According to data available at March 2025.
Up to 76.7% of Medicare Part D patients may be covered.	Hasta el 76,7 % de los pacientes con Medicare Part D pueden tener cobertura.	Up to 76.7% of Medicare Part D-patients may be covered.
VYZULTA is now covered for nearly 77%* of patients with Medicare prescription coverage	Actualmente, casi el 77 %* de los pacientes con Medicare tienen VYZULTA cubierta.	At the moment, almost 77%* of patients are covered for VYZULTA by Medicare.
Have Medicare Part D?	¿Tiene Medicare Part D?	Do you have Medicare Part D?
TREATMENT JOURNEY SAVINGS	AHORRE EN SU TRATAMIENTO	SAVE ON YOUR TREATMENT
Take control of your treatment journey	Tome las riendas de su salud	Take charge of your health
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD	IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Brown color, or increased brown color, of the iris can occur, which may be permanent.	El iris puede volverse marrón o adquirir un tono más amarronado de forma temporal o permanente.	The iris may temporarily or permanently turn brown or acquire a more brownish tone.
Darkening of the eyelid skin may also occur, which is usually reversible after VYZULTA treatment is discontinued.	También la piel del párpado puede oscurecerse, lo cual suele revertir al suspenderse el tratamiento con VYZULTA.	The skin of the eyelid may also darken, which usually reverses when treatment with VYZULTA is suspended.
Please see additional Important Safety Information throughout and full Prescribing Information in pocket.	Consulte más información importante de seguridad en este documento y en la versión completa de la Posología e indicaciones de uso introducidas en la solapa.	Please consult more important safety information in this document and in the complete Dosage and indications for use provided in the inside flap.
* See full Prescribing Information.	* Consulte la versión completa de la Posología e indicaciones de uso.	* Consult the complete version of the Dosage and indications for use.
YOUR VISION.	SU VISIÓN.	YOUR SIGHT.
YOUR VYZULTA.	SU VYZULTA.	YOUR VYZULTA.
Lower your eye pressure from open-angle glaucoma or ocular hypertension	Reduzca la presión ocular provocada por el glaucoma de ángulo abierto o la hipertensión ocular	Reduce eye pressure caused by open-angle glaucoma or ocular hypertension
One Drop	Una gota	One drop
Once A Day*	una vez al día*	once a day*
Not an actual patient.	Paciente ficticio.	Fictional patient.
SPANISH	SPANISH ESPAÑOL	SPANISH SPANISH
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont’d)	INFORMACIÓN IMPORTANTE DE	IMPORTANT SAFETY INFORMATION

	SEGURIDAD (continuación)	(continued)
Avoid touching the tip of the container to the eye or any other surface, including a finger, in order to avoid contamination of the solution by bacteria.	Evite que la punta del envase entre en contacto con el ojo o cualquier otra superficie, como el dedo, para evitar que la solución se contamine con bacterias.	Avoid touching the tip of the container with your eye or any other surface, such as your finger, in order to prevent the solution from becoming contaminated with bacteria.
Serious damage to the eye and possible loss of vision may result from using contaminated solutions.	El uso de una solución contaminada podría causar daños graves a los ojos e incluso pérdida de visión.	Using a contaminated solution could cause serious eye damage and even loss of sight.
Please see additional Important Safety Information throughout and full Prescribing Information in pocket.	Consulte más información importante de seguridad en este documento y en la versión completa de la Posología e indicaciones de uso introducidas en la solapa.	Please consult more important safety information in this document and in the complete Dosage and indications for use provided in the inside flap.
What is ocular hypertension?	¿Qué es la hipertensión ocular?	What is ocular hypertension?
Ocular hypertension is when the fluid in your eye is not draining properly which causes the pressure in your eye to be higher than normal	La hipertensión ocular se produce cuando no se drena adecuadamente el líquido del ojo, lo que provoca una presión ocular más elevada de lo normal	Ocular hypertension occurs when the ocular fluid does not drain properly, resulting in higher than normal eye pressure.
There are no signs or symptoms for ocular hypertension, so people diagnosed with this condition should be monitored carefully by an eye doctor, as they may be at a higher risk of glaucoma	Las personas diagnosticadas de hipertensión ocular no presentan signos ni síntomas, por lo que deben estar bajo la atenta supervisión de un optometrista o un oftalmólogo, ya que pueden tener un mayor riesgo de padecer glaucoma	People diagnosed with ocular hypertension do not show any signs or symptoms; therefore, they should be closely supervised by an optometrist or an ophthalmologist, as they may be at increased risk of glaucoma.
If left untreated, this may lead to a visual disability and, eventually, blindness.	De no tratarse, podría ocasionar una discapacidad visual y, a la larga, ceguera.	If left untreated, it could lead to visual impairment and, eventually, blindness.
Central field vision loss	Pérdida de visión central	Loss of central vision
Peripheral (side) vision loss	Pérdida de visión periférica (lateral)	Loss of peripheral (side) vision
As the condition worsens, people with glaucoma will slowly begin to lose peripheral (side) vision, while others may experience central field loss.	Las personas con glaucoma pierden gradualmente visión periférica (lateral) conforme empeora la enfermedad y, en algunos casos, se produce pérdida de la visión central.	People with glaucoma gradually their lose peripheral (side) vision as the condition worsens, and in some cases, central vision loss occurs.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (continued)
If you are using other eye drops in addition to VYZULTA, wait 5 minutes between using each type of eye drop.	Si utiliza otro colirio además de VYZULTA, espere 5 minutos entre uno y otro.	If you use other eye drops in addition to VYZULTA, wait 5 minutes between each use.
Please see additional Important Safety Information throughout and full Prescribing	Consulte más información importante de seguridad en este documento y en la versión	Please consult more important safety information in this document and in the

Information in pocket.	completa de la Posología e indicaciones de uso introducidas en la solapa.	complete Dosage and indications for use provided in the inside flap.
Learn more at VYZULTA.com	Más información en VYZULTA.com	Further information is available at VYZULTA.com
Scan the QR code or visit VYZULTA.com for tips for treatment success, resources, and savings offers.	Escanee el código QR o visite VYZULTA.com para obtener consejos sobre el tratamiento, recursos y descuentos.	Scan the QR code or visit VYZULTA.com for treatment tips, resources and discounts.
Concerned about eye redness?	¿Le preocupa el enrojecimiento de los ojos?	Are you worried about redness?
Some glaucoma treatments may cause high rates of eye redness, leading to discontinuation.	Algunos tratamientos de glaucoma pueden enrojecer mucho los ojos, en cuyo caso se suspenden.	Some glaucoma treatments can cause severe redness in the eyes, in which case they should be suspended.
In clinical trials, VYZULTA had low rates of eye redness and <1% of patients stopped using it due to side effects.	En los ensayos clínicos, VYZULTA ofreció un bajo índice de enrojecimiento ocular, y menos del 1 % de los pacientes dejaron de utilizarlo debido a efectos secundarios.	In clinical trials, VYZULTA demonstrated a low level of eye redness, and less than 1% of patients suspended its use due to side effects.
Use VYZULTA daily as prescribed	Use VYZULTA diariamente según lo prescrito	Use VYZULTA daily as prescribed
VYZULTA may help lower your eye pressure, which is important in managing your glaucoma or ocular hypertension.	VYZULTA puede disminuir la presión ocular, cosa que resulta de gran importancia para controlar el glaucoma o la hipertensión ocular.	VYZULTA can lower eye pressure, which is important for controlling glaucoma or ocular hypertension.
Using VYZULTA as directed may support your treatment goals.	Utilizar VYZULTA según las indicaciones puede ayudarle a alcanzar los objetivos de su tratamiento.	Using VYZULTA as prescribed can help you achieve your treatment goals.
There is no generic equivalent for VYZULTA.	No existe un equivalente genérico de VYZULTA.	VYZULTA has no generic equivalent.
If the pharmacy suggests a different product, it is not the same as VYZULTA.	Si la farmacia le sugiere otro producto, ha de saber que será diferente a VYZULTA.	If the pharmacy suggests another product, you should be aware that it will be different from VYZULTA.
If the pharmacy is out of stock, ask them to order it from the wholesaler.	Si está agotado, solicite que se lo encarguen al mayorista.	If it is out of stock, please request that it be ordered from the wholesaler.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (continued)
Gradual changes to eyelashes may occur, including increased length, thickness, color, number of eyelashes and/or direction of eyelash growth.	Las pestañas pueden sufrir cambios graduales, como hacerse más largas o gruesas, cambiar de color, aumentar en cantidad y/o crecer en otra dirección.	Eyelashes may undergo gradual changes, such as becoming longer or thicker, changing color, increasing in number, and/or growing in a different direction.
These changes may result in a difference in appearance of each eye.	Estos cambios pueden alterar el aspecto de los ojos.	These changes can alter the appearance of the eyes.
These changes are usually reversible after	Estos cambios suelen revertir tras	These changes usually reverse after

VYZULTA treatment is discontinued.	suspenderse el tratamiento con VYZULTA.	suspending VYZULTA.
Glaucoma is often called the silent thief of sight because it shows no symptoms until the damage is advanced.	El glaucoma se conoce como el ladrón silencioso de la vista debido a que no se aprecian síntomas hasta que el daño es considerable.	Glaucoma is known as the silent thief of sight because symptoms are not noticed until the damage is already significant.
That's why early detection and regular eye exams are crucial to protecting your vision.	Por tanto, es esencial detectarlo temprano y hacerse revisiones oftalmológicas con regularidad para proteger la visión.	Therefore, it is essential to detect it early and have regular eye check-ups to protect your sight.
While glaucoma can't be cured or reversed, lowering eye pressure can help preserve sight.	Aunque el glaucoma es incurable e irreversible, reducir la presión ocular puede ayudar a conservar la visión.	Although glaucoma is incurable and irreversible, reducing eye pressure can help preserve sight.
What is open-angle glaucoma?	¿Qué es el glaucoma de ángulo abierto?	What is open-angle glaucoma?
Open-angle glaucoma is a disease that gradually causes vision loss and may lead to blindness	El glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad que provoca la pérdida gradual de visión y, en ocasiones, puede derivar en ceguera	Open-angle glaucoma is a disease that causes gradual vision loss and, in certain cases, may lead to blindness
It occurs when the fluid in one or both of your eyes does not drain properly	Se produce cuando el líquido de uno o ambos ojos no se drena adecuadamente	It occurs when the fluid in one or both eyes does not drain properly.
This increases the pressure in your eye, which may damage the optic nerve	Ello produce un aumento de la presión y puede dañar el nervio óptico	This causes an increase in pressure and can damage the optic nerve
UNDERSTANDING EYE PRESSURE	LA PRESIÓN OCULAR EXPLICADA	EYE PRESSURE EXPLAINED
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (continued)
Tell your doctor immediately about any change in your eye, any eye condition that develops, any sudden change in your vision, any eye side effects, or if you have eye surgery.	Informe a su médico de inmediato si nota algún cambio en el ojo, desarrolla alguna enfermedad ocular, advierte cambios repentinos en la visión, sufre algún efecto secundario en los ojos o le van a operar de los ojos.	Tell your ophthalmologist immediately if you notice any changes in your eye, develop any eye disease, notice any sudden changes in vision, experience any eye side effects or are undergoing eye surgery.
Remove contact lenses before putting VYZULTA in your eyes.	Antes de aplicarse VYZULTA, quítese las lentillas.	Remove your contact lenses before applying VYZULTA.
Lenses may be reinserted 15 minutes later.	Puede volver a ponerse las lentillas después de 15 minutos.	You can put your contact lenses back in after 15 minutes.
Keep up with regular eye appointments and use VYZULTA once daily in the evening as prescribed to help preserve your vision	Acuda regularmente al oftalmólogo y aplíquese VYZULTA una vez al día, por la noche, según lo prescrito, para protegerse la vista	Visit your ophthalmologist regularly and apply VYZULTA once a day, at night, as prescribed to protect your sight
What is VYZULTA?	¿Qué es VYZULTA?	What is VYZULTA?
VYZULTA is a treatment drop that may help	VYZULTA es un colirio que puede disminuir	VYZULTA is an eye drop that can lower eye

reduce eye pressure in people with open-angle glaucoma or ocular hypertension	la presión ocular de las personas con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular	pressure in people with open-angle glaucoma or ocular hypertension
Lowering eye pressure can help reduce the risk of vision loss due to glaucoma	Al disminuir la presión ocular, puede reducir el riesgo de pérdida de visión debido al glaucoma	By lowering eye pressure, you can reduce the risk of sight loss due to glaucoma.
Not an actual patient.	Paciente ficticio.	Fictional patient.
Index	Índice	Index