По мере ухудшения состояния у лиц с глаукомой постепенно снижается периферическое (боковое) зрение, в то время как у других возможна потеря центрального зрения.



Потеря периферического (бокового) зрения



Потеря центрального зрения

При отсутствии лечения это состояние может привести к потере зрения и, в конечном итоге, к слепоте.

Что такое глазная гипертензия?

- Глазная гипертензия — состояние, при котором жидкость в глазу не отводится должным образом, вследствие чего давление в глазу превышает норму.
- Признаков или симптомов глазной гипертензии не существует, поэтому люди с таким диагнозом должны регулярно посещать окулиста, так как у них может быть повышен риск развития глаукомы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)

- Не прикасайтесь кончиком контейнера к глазу или любой другой поверхности, в том числе к пальцу, во избежание заражения раствора бактериями. Применение загрязненных растворов может привести к серьезному повреждению глаза и возможной потере зрения.

Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией о безопасности и полной инструкцией по применению препарата, находящимися в кармашке.

ЭКОНОМИЯ НА ПУТИ ЛЕЧЕНИЯ

Вы участвуете в программе Medicare Part D?

VYZULTA теперь покрывается **почти для 77%* пациентов**, для которых программа Medicare предусматривает компенсацию расходов на рецептурные препараты.

* По данным на март 2025 г. Страховое покрытие может охватывать до 76,7% пациентов, участвующих в программе Medicare Part D.

Для лиц, отвечающих критериям участия в программе «Extra Help», стоимость препарата VYZULTA составляет около $12 или меньше.

Если вы участвуете в программах Medicare и Medicaid, вы уже соответствуете критериям для участия в программе «Extra Help».

Отвечающие критериям† пациенты с коммерческой страховкой могут заплатить всего лишь **$25 за запас препарата на 90 дней**, приобретаемый по первому рецепту и в виде соответствующих повторных заказов.

Исключительно в независимых аптеках, участвующих в программе. В аптеках, не участвующих в программе, отвечающие критериям пациенты с коммерческой страховкой могут заплатить всего лишь $35.

† Действуют правила, условия и ограничения. Критерии соответствия, а также правила и условия представлены на веб-сайте BauschAccessProgram.com.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)

- Наиболее распространенными побочными эффектами, отмеченными в исследованиях, были покраснение глаза, раздражение глаза, боль в глазу и боль после закапывания капель в глаз.

Рекомендуется сообщать о негативных побочных эффектах рецептурных препаратов в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA). Посетите веб-сайт www.fda.gov/medwatch или позвоните по номеру 1-800-FDA-1088

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

VYZULTA® (офтальмологический раствор латанопростина бунода), 0,024 %, применяется для снижения внутриглазного (глазного) давления у пациентов с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией.

BAUSCH + LOMB

©2025 Bausch + Lomb. VYZ.0043.USA.25

VYZULTA®
(latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%

RUSSIAN
РУССКИЙ

VYZULTA®
(latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%



Контролируйте
СВОЙ
путь лечения

На фото изображена модель.



ВАШЕ ЗРЕНИЕ. ВАШ ПРЕПАРАТ VYZULTA.

Снизьте внутриглазное давление на фоне открытоугольной глаукомы или глазной гипертензии

* См. полную информацию по применению препарата.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Возможно окрашивание радужной оболочки в коричневый цвет при изначально другом цвете глаз или ее потемнение у кареглазых людей. Этот эффект может быть необратимым. Также может наблюдаться потемнение кожи век, что обычно обратимо после прекращения лечения препаратом VYZULTA.

Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией о безопасности и полной инструкцией по применению препарата, находящимися в кармашке.

ПОНИМАНИЕ СУТИ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ

Что такое открытоугольная глаукома?

- Открытоугольная глаукома — заболевание, при котором зрение постепенно снижается, что может привести к слепоте.
- Это происходит, когда жидкость в одном или обоих глазах не отводится должным образом.
- При этом в глазу повышается давление, что может повредить зрительный нерв.

Глаукому часто называют *молчаливым вором зрения,* поскольку симптомы не проявляются до тех пор, пока повреждение не станет существенным. Именно поэтому раннее выявление и регулярные обследования глаз имеют решающее значение для защиты вашего зрения. Глаукому невозможно вылечить или обратить вспять, однако снижение внутриглазного давления может помочь сохранить зрение.



На фото изображена модель.

VYZULTA®
(latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%

Что такое VYZULTA?

- VYZULTA — это лечебные капли, которые могут помочь снизить внутриглазное давление у лиц с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией.
- Снижение внутриглазного давления может помочь снизить риск потери зрения из-за глаукомы.

Регулярно посещайте офтальмолога и применяйте препарат VYZULTA один раз в сутки вечером в соответствии с предписанием врача, чтобы сохранить зрение.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)

- Могут происходить постепенные изменения со стороны ресниц, включая увеличение их длины и толщины, изменение цвета, количества и (или) направления роста. Из-за таких изменений глаза могут выглядеть по-разному. Эти изменения обычно обращаются вспять после прекращения лечения препаратом VYZULTA.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)

- Немедленно сообщайте своему врачу о любых изменениях касательно глаз, любых развивающихся заболеваниях глаз, любых внезапных изменениях зрения, любых побочных эффектах со стороны глаз или о перенесенной операции на глазу.
- Перед закапыванием препарата VYZULTA в глаза снимайте контактные линзы. Линзы можно будет надеть снова через 15 минут.

Применяйте препарат VYZULTA ежедневно согласно назначению врача.

Препарат VYZULTA может помочь снизить глазное давление, что важно при лечении глаукомы или глазной гипертензии. **Применение препарата VYZULTA согласно указаниям может способствовать достижению целей вашего лечения.**

Воспроизведенного эквивалента препарата VYZULTA не существует. **Если в аптеке предлагают другой препарат, он не будет точно таким, как VYZULTA.** Если в аптеке нет нужного вам препарата, попросите сотрудника заказать его на предприятии оптовой торговли.

Вас беспокоит покраснение глаза?

Некоторые препараты для лечения глаукомы могут вызывать сильное покраснение глаза, что приводит к необходимости прекращения лечения.

В клинических исследованиях **случаи покраснения глаза на фоне лечения препаратом VYZULTA встречались редко, при этом менее 1 % пациентов прекратили его применение из-за развития побочных эффектов.**

Узнайте больше на веб-сайте VYZULTA.com

Отсканируйте QR-код или посетите веб-сайт VYZULTA.com, чтобы получить советы для успешного лечения, ресурсы и предложения для экономии средств.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)

- Если вы используете другие глазные капли в дополнение к препарату VYZULTA, выжидайте 5 минут между применениями каждого типа глазных капель.

Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией о безопасности и полной инструкцией по применению препарата, находящимися в кармашке.

Source segment	Translation	Back Translation
Contents	Содержание	Contents
©2025 Bausch + Lomb.	©2025 Bausch + Lomb.	©2025 Bausch + Lomb.
VYZ.0043.USA.25	VYZ.0043.USA.25	VYZ.0043.USA.25
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (continued)
The most common side effects seen in studies were eye redness, eye irritation, eye pain, and pain after putting the drops in your eye.	Наиболее распространенными побочными эффектами, отмеченными в исследованиях, были покраснение глаза, раздражение глаза, боль в глазу и боль после закапывания капель в глаз.	The most common side effects noted in studies were eye redness, eye irritation, eye pain, and pain after instilling drops into the eye.
You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA.	Рекомендуется сообщать о негативных побочных эффектах рецептурных препаратов в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).	It is recommended that adverse side effects to prescription drugs be reported to the U.S. Food and Drug Administration (FDA).
Visit www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088	Посетите веб-сайт www.fda.gov/medwatch или позвоните по номеру 1-800-FDA-1088	Visit the website www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088
INDICATION	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	INDICATIONS FOR USE
VYZULTA® (latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%, is used to lower intraocular (eye) pressure in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension.	VYZULTA® (офтальмологический раствор латанопростина бунода), 0,024 %, применяется для снижения внутриглазного (глазного) давления у пациентов с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией.	VYZULTA® (latanoprostin bunod ophthalmic solution) 0.024% is used to reduce intraocular (eye) pressure in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension.
† Terms, conditions, and limitations apply.	† Действуют правила, условия и ограничения.	† Terms, conditions and restrictions apply.
Please see eligibility criteria and terms and conditions at BauschAccessProgram.com.	Критерии соответствия, а также правила и условия представлены на веб-сайте BauschAccessProgram.com.	Eligibility criteria, as well as terms and conditions, are available on the BauschAccessProgram.com website.
Eligible† commercially insured	Отвечающие критериям†	Eligible† patients with commercial

patients may pay as little as a $25 copay for up to a 90-day supply for first Rx and eligible refills.	пациенты с коммерческой страховкой могут заплатить всего лишь $25 за запас препарата на 90 дней, приобретаемый по первому рецепту и в виде соответствующих повторных заказов.	insurance can pay as little as $25 for a 90-day supply of the drug for their first prescription and qualifying refills.
Exclusively at participating independent pharmacies.	Исключительно в независимых аптеках, участвующих в программе.	Exclusively in independent pharmacies participating in the program.
At non-participating pharmacies, eligible commercial patients may pay as little as a $35 copay.	В аптеках, не участвующих в программе, отвечающие критериям пациенты с коммерческой страховкой могут заплатить всего лишь $35.	At non-participating pharmacies, eligible patients with commercial insurance may pay as little as $35.
Those who qualify for the “Extra Help” Program pay about $12 or less for VYZULTA	Для лиц, отвечающих критериям участия в программе «Extra Help», стоимость препарата VYZULTA составляет около $12 или меньше.	For individuals who meet the criteria for participation in the Extra Help program, the cost of VYZULTA is about $12 or less.
If you are enrolled in Medicare and Medicaid, you already qualify for the “Extra Help” Program	Если вы участвуете в программах Medicare и Medicaid, вы уже соответствуете критериям для участия в программе «Extra Help».	If you have Medicare or Medicaid, you already qualify for the Extra Help program.
* Based on data from March 2025.	* По данным на март 2025 г.	*Based on data for March 2025.
Up to 76.7% of Medicare Part D patients may be covered.	Страховое покрытие может охватывать до 76,7% пациентов, участвующих в программе Medicare Part D.	Insurance may cover up to 76.7% of patients enrolled in Medicare Part D.
VYZULTA is now covered for nearly 77%* of patients with Medicare prescription coverage	VYZULTA теперь покрывается почти для 77%* пациентов, для которых программа Medicare предусматривает компенсацию расходов на рецептурные препараты.	VYZULTA is now covered for almost 77%* of patients for whom the Medicare program provides reimbursement for prescription drug costs.
Have Medicare Part D?	Вы участвуете в программе Medicare Part D?	Are you enrolled in Medicare Part D?
TREATMENT JOURNEY SAVINGS	ЭКОНОМИЯ НА ПУТИ ЛЕЧЕНИЯ	SAVINGS ON THE PATH OF TREATMENT

Take control of your treatment journey	Контролируйте свой путь лечения	Take control of your treatment path
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ	IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Brown color, or increased brown color, of the iris can occur, which may be permanent.	Возможно окрашивание радужной оболочки в коричневый цвет при изначально другом цвете глаз или ее потемнение у кареглазых людей. Этот эффект может быть необратимым.	Brown pigmentation of the iris can occur in individuals with a different original eye color, or the iris may darken in people with brown eyes. This effect may be irreversible.
Darkening of the eyelid skin may also occur, which is usually reversible after VYZULTA treatment is discontinued.	Также может наблюдаться потемнение кожи век, что обычно обратимо после прекращения лечения препаратом VYZULTA.	Darkening of the skin of the eyelids may also occur, which is usually reversible after discontinuing treatment with VYZULTA.
Please see additional Important Safety Information throughout and full Prescribing Information in pocket.	Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией о безопасности и полной инструкцией по применению препарата, находящимися в кармашке.	Please see additional important safety information and full instructions for use located in the pocket.
* See full Prescribing Information.	* См. полную информацию по применению препарата.	*See full prescribing information.
YOUR VISION.	ВАШЕ ЗРЕНИЕ.	YOUR VISION.
YOUR VYZULTA.	ВАШ ПРЕПАРАТ VYZULTA.	YOUR VYZULTA MEDICINE.
Lower your eye pressure from open-angle glaucoma or ocular hypertension	Снизьте внутриглазное давление на фоне открытоугольной глаукомы или глазной гипертензии	Reduce intraocular pressure in open-angle glaucoma or ocular hypertension
One Drop	Одна капля	One drop
Once A Day*	Один раз в сутки*	Once a day*
Not an actual patient.	На фото изображена модель.	A model is shown on this photo.
RUSSIAN	RUSSIAN РУССКИЙ	RUSSIAN RUSSIAN
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (continued)
Avoid touching the tip of the container to the eye or any other surface, including a finger, in order to avoid contamination of the solution by bacteria.	Не прикасайтесь кончиком контейнера к глазу или любой другой поверхности, в том числе к пальцу, во избежание заражения раствора бактериями.	Do not touch the tip of the container to your eye or any other surface, including your finger, to avoid contaminating the solution with bacteria.

Serious damage to the eye and possible loss of vision may result from using contaminated solutions.	Применение загрязненных растворов может привести к серьезному повреждению глаза и возможной потере зрения.	Using contaminated solutions may cause serious eye injury and possible loss of vision.
Please see additional Important Safety Information throughout and full Prescribing Information in pocket.	Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией о безопасности и полной инструкцией по применению препарата, находящимися в кармашке.	Please see additional important safety information and full instructions for use located in the pocket.
What is ocular hypertension?	Что такое глазная гипертензия?	What is ocular hypertension?
Ocular hypertension is when the fluid in your eye is not draining properly which causes the pressure in your eye to be higher than normal	Глазная гипертензия — состояние, при котором жидкость в глазу не отводится должным образом, вследствие чего давление в глазу превышает норму.	Ocular hypertension is a condition in which fluid in the eye does not drain properly, causing the pressure in the eye to rise and exceed normal levels.
There are no signs or symptoms for ocular hypertension, so people diagnosed with this condition should be monitored carefully by an eye doctor, as they may be at a higher risk of glaucoma	Признаков или симптомов глазной гипертензии не существует, поэтому люди с таким диагнозом должны регулярно посещать окулиста, так как у них может быть повышен риск развития глаукомы.	There are no signs or symptoms of ocular hypertension, so people diagnosed with this condition should see an eye doctor regularly as they may have an increased risk of developing glaucoma.
If left untreated, this may lead to a visual disability and, eventually, blindness.	При отсутствии лечения это состояние может привести к потере зрения и, в конечном итоге, к слепоте.	If left untreated, this condition can lead to a loss of vision and eventually blindness.
Central field vision loss	Потеря центрального зрения	Loss of central vision
Peripheral (side) vision loss	Потеря периферического (бокового) зрения	Loss of peripheral (side) vision
As the condition worsens, people with glaucoma will slowly begin to lose peripheral (side) vision, while others may experience central field loss.	По мере ухудшения состояния у лиц с глаукомой постепенно снижается периферическое (боковое) зрение, в то время как у других возможна потеря центрального зрения.	As the condition worsens, people with glaucoma gradually experience a loss of peripheral (side) vision, while others may experience loss of central vision.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (continued)
If you are using other eye drops in addition to VYZULTA, wait 5 minutes	Если вы используете другие глазные капли в дополнение к	If you use other eye drops in addition to VYZULTA, wait 5 minutes between

between using each type of eye drop.	препарату VYZULTA, выжидайте 5 минут между применениями каждого типа глазных капель.	using each type of eye drop.
Please see additional Important Safety Information throughout and full Prescribing Information in pocket.	Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией о безопасности и полной инструкцией по применению препарата, находящимися в кармашке.	Please see additional important safety information and full instructions for use located in the pocket.
Learn more at VYZULTA.com	Узнайте больше на веб-сайте VYZULTA.com	Learn more at VYZULTA.com
Scan the QR code or visit VYZULTA.com for tips for treatment success, resources, and savings offers.	Отсканируйте QR-код или посетите веб-сайт VYZULTA.com, чтобы получить советы для успешного лечения, ресурсы и предложения для экономии средств.	Scan the QR code or visit VYZULTA.com for treatment success tips, resources and money-saving offers.
Concerned about eye redness?	Вас беспокоит покраснение глаза?	Are you bothered by redness of the eye?
Some glaucoma treatments may cause high rates of eye redness, leading to discontinuation.	Некоторые препараты для лечения глаукомы могут вызывать сильное покраснение глаза, что приводит к необходимости прекращения лечения.	Some glaucoma medications can cause severe redness of the eye, requiring treatment to be stopped.
In clinical trials, VYZULTA had low rates of eye redness and <1% of patients stopped using it due to side effects.	В клинических исследованиях случаи покраснения глаза на фоне лечения препаратом VYZULTA встречались редко, при этом менее 1 % пациентов прекратили его применение из-за развития побочных эффектов.	In clinical trials cases of eye redness while receiving treatment with VYZULTA were rare. Less than 1% of patients discontinued the drug due to side effects.
Use VYZULTA daily as prescribed	Применяйте препарат VYZULTA ежедневно согласно назначению врача.	Use VYZULTA daily as directed by your doctor.
VYZULTA may help lower your eye pressure, which is important in managing your glaucoma or ocular hypertension.	Препарат VYZULTA может помочь снизить глазное давление, что важно при лечении глаукомы или глазной гипертензии.	VYZULTA may help lower eye pressure, which is important in the treatment of glaucoma or ocular hypertension.
Using VYZULTA as directed may	Применение препарата VYZULTA	Using VYZULTA as directed may help

support your treatment goals.	согласно указаниям может способствовать достижению целей вашего лечения.	you reach your treatment goals.
There is no generic equivalent for VYZULTA.	Воспроизведенного эквивалента препарата VYZULTA не существует.	There is no generic equivalent of VYZULTA.
If the pharmacy suggests a different product, it is not the same as VYZULTA.	Если в аптеке предлагают другой препарат, он не будет точно таким, как VYZULTA.	If the pharmacy offers another drug, it will not exactly be the same as VYZULTA.
If the pharmacy is out of stock, ask them to order it from the wholesaler.	Если в аптеке нет нужного вам препарата, попросите сотрудника заказать его на предприятии оптовой торговли.	If the pharmacy does not have the drug you need, ask an employee to order it from the wholesaler.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (continued)
Gradual changes to eyelashes may occur, including increased length, thickness, color, number of eyelashes and/or direction of eyelash growth.	Могут происходить постепенные изменения со стороны ресниц, включая увеличение их длины и толщины, изменение цвета, количества и (или) направления роста.	Gradual changes in eyelashes may occur, including increases in length and thickness, or a change in color, number, and/or direction of growth.
These changes may result in a difference in appearance of each eye.	Из-за таких изменений глаза могут выглядеть по-разному.	These changes may cause each eye to look different.
These changes are usually reversible after VYZULTA treatment is discontinued.	Эти изменения обычно обращаются вспять после прекращения лечения препаратом VYZULTA.	These changes usually reverse after discontinuing treatment with VYZULTA.
Glaucoma is often called the silent thief of sight because it shows no symptoms until the damage is advanced.	Глаукому часто называют молчаливым вором зрения, поскольку симптомы не проявляются до тех пор, пока повреждение не станет существенным.	Glaucoma is often called the silent thief of sight because symptoms do not appear until the damage is extensive.
That's why early detection and regular eye exams are crucial to protecting your vision.	Именно поэтому раннее выявление и регулярные обследования глаз имеют решающее значение для защиты вашего зрения.	That's why early detection and regular eye exams are critical to protect your vision.
While glaucoma can't be cured or	Глаукому невозможно вылечить	Glaucoma cannot be cured or

reversed, lowering eye pressure can help preserve sight.	или обратить вспять, однако снижение внутриглазного давления может помочь сохранить зрение.	reversed, but lowering eye pressure can help preserve vision.
What is open-angle glaucoma?	Что такое открытоугольная глаукома?	What is open angle glaucoma?
Open-angle glaucoma is a disease that gradually causes vision loss and may lead to blindness	Открытоугольная глаукома — заболевание, при котором зрение постепенно снижается, что может привести к слепоте.	Open-angle glaucoma is a disease in which vision gradually decreases, which can lead to blindness.
It occurs when the fluid in one or both of your eyes does not drain properly	Это происходит, когда жидкость в одном или обоих глазах не отводится должным образом.	This occurs when fluid in one or both eyes does not drain properly.
This increases the pressure in your eye, which may damage the optic nerve	При этом в глазу повышается давление, что может повредить зрительный нерв.	This increases the pressure in the eye, which can damage the optic nerve.
UNDERSTANDING EYE PRESSURE	ПОНИМАНИЕ СУТИ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ	UNDERSTANDING INTRAOCULAR PRESSURE
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (continued)
Tell your doctor immediately about any change in your eye, any eye condition that develops, any sudden change in your vision, any eye side effects, or if you have eye surgery.	Немедленно сообщайте своему врачу о любых изменениях касательно глаз, любых развивающихся заболеваниях глаз, любых внезапных изменениях зрения, любых побочных эффектах со стороны глаз или о перенесенной операции на глазу.	Tell your doctor right away about any changes in your eyes, any other developing eye diseases, any sudden changes in vision, any side effects involving your eyes, or if you have had eye surgery.
Remove contact lenses before putting VYZULTA in your eyes.	Перед закапыванием препарата VYZULTA в глаза снимайте контактные линзы.	Remove contact lenses before instilling VYZULTA into your eyes.
Lenses may be reinserted 15 minutes later.	Линзы можно будет надеть снова через 15 минут.	The lenses can be put back in after 15 minutes.
Keep up with regular eye appointments and use VYZULTA once daily in the evening as prescribed to help preserve your vision	Регулярно посещайте офтальмолога и применяйте препарат VYZULTA один раз в сутки вечером в соответствии с предписанием врача, чтобы	See your eye doctor regularly and use VYZULTA once daily in the evening as directed by your doctor to help preserve your vision.

	сохранить зрение.	
What is VYZULTA?	Что такое VYZULTA?	What is VYZULTA?
VYZULTA is a treatment drop that may help reduce eye pressure in people with open-angle glaucoma or ocular hypertension	VYZULTA — это лечебные капли, которые могут помочь снизить внутриглазное давление у лиц с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией.	VYZULTA is a medicated eye drop that can help lower intraocular pressure in people with open-angle glaucoma or ocular hypertension.
Lowering eye pressure can help reduce the risk of vision loss due to glaucoma	Снижение внутриглазного давления может помочь снизить риск потери зрения из-за глаукомы.	Lowering intraocular pressure may help reduce the risk of vision loss due to glaucoma.
Not an actual patient.	На фото изображена модель.	A model is shown on this photo.
Index	Указатель	Indicator