상태가 악화됨에 따라 녹내장 환자는 서서히 주변(측면) 시력을 잃기 시작하는 반면, 다른 환자는 중심 시야를 잃을 수 있습니다.



주변(측면) 시야 상실



중심 시야 상실

치료하지 않고 방치할 경우 시각 장애로 이어지고 결국 실명에 이를 수도 있습니다.

안구고혈압이란 무엇인가요?

- 안구고혈압은 눈의 체액이 제대로 배출되지 않아 눈의 압력이 정상보다 높아지는 현상입니다.
- 안구고혈압은 징후나 증상이 없기 때문에, 이 질환으로 진단받은 사람은 녹내장 위험이 더 높을 수 있으므로 안과 의사의 주의 깊은 모니터링을 받아야 합니다.

중요 안전 정보(계속)

- 용액이 박테리아에 오염되는 것을 방지하기 위해 용기 끝부분을 눈이나 손가락 등 다른 표면에 대지 않도록 하세요. 오염된 용액을 사용하면 눈에 심각한 손상을 입거나 시력을 잃을 수도 있습니다.

추가적인 중요 안전 정보를 본문에서 읽으시고 전체 처방 정보는 포켓에 있는 내용을 참조하세요.

치료비 절약

Medicare Part D가 있습니까?

VYZULTA는 현재 Medicare 처방약 보장을 받는 **환자의 약 77%***가 보장됩니다.

*2025년 3월 데이터 기준. 최대 76.7%의 Medicare Part D 환자가 보장을 받을 수 있습니다.

"Extra Help" 프로그램에 대한 자격이 있는 환자는 VYZULTA에 대해 약 $12 이하를 지불합니다

Medicare와 Medicaid에 등록되어 있는 경우 이미 "Extra Help" 프로그램에 대한 자격이 있는 것입니다

적격† 상업 보험에 가입한 환자는 첫 번째 처방전 및 적격 리필에 대해 **최대 90일분까지 최소 $25의 공동 부담금**만 지불할 수 있습니다.

이금액은참여하는 독립 약국에서만 적용됩니다. 참여하지 않는 약국에서는 적격 상업 보험 환자가 최소 $35의 공동 부담금을 지불할 수 있습니다.

†이용 약관과 한도가 적용됩니다. 자격 기준과 이용 약관을 BauschAccessProgram.com에서 확인하세요.

중요 안전 정보(계속)

- 연구에서 가장 흔하게 나타난 부작용은 눈의 충혈, 눈 자극, 눈의 통증, 눈에 점안액을 넣은 후의 통증이었습니다.

처방약의 부작용은 FDA에 신고해주시기 바랍니다. www.fda.gov/medwatch를 방문하거나 1-800-FDA-1088로 전화하십시오.

용도

VYZULTA®(라타노프로스틴 부노드 점안액) 0.024%는 개방각녹내장 또는 안구고혈압 환자의 안압을 낮추는 데 사용됩니다.

BAUSCH + LOMB

©2025 Bausch + Lomb. VYZ.0044.USA.25

VYZULTA®
(latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%

VYZULTA®
(latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%

KOREAN
한국어



치료 과정을 스스로 통제하세요

실제 환자가 아닙니다.



여러분의 시력. 여러분의 VYZULTA.

개방각녹내장 또는 안구고혈압으로 인한 안압을 낮추세요.

*전체 처방 정보를 확인하세요.

중요 안전 정보

- 홍채가 갈색으로 변하거나 갈색이 더 진해질 수 있으며, 이는 영구적일 수 있습니다. 눈꺼풀 피부가 어두워지는 현상도 발생할 수 있으며, 대개 VYZULTA 치료를 중단하면 돌아옵니다.

추가적인 중요 안전 정보를 본문에서 읽으시고 전체 처방 정보는 포켓에 있는 내용을 참조하세요.

안압 이해하기

개방각녹내장이란 무엇인가요?

- 개방각녹내장은 점진적으로 시력을 상실하게 하는 질환으로 실명으로 이어질 수 있습니다.
- 이 질환은 한쪽 또는 양쪽 눈의 체액이 제대로 배출되지 않을 때 발생합니다.
- 이로 인해 눈의 압력이 증가하여 시신경이 손상될 수 있습니다.

녹내장은 손상이 진행될 때까지 증상이 나타나지 않기 때문에 종종 *조용한 시력 도둑*이라고 불립니다. 그렇기 때문에 조기 발견과 정기적인 시력 검사는 시력 보호에 매우 중요합니다. 녹내장은 치료하거나 되돌릴 수 없지만 안압을 낮추면 시력을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.



실제 환자가 아닙니다.

VYZULTA®
(latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%

VYZULTA란 무엇인가요?

- VYZULTA는 개방각녹내장이나 안구고혈압 환자의 안압을 낮추는 데 도움이 될 수 있는 치료제입니다.
- 안압을 낮추면 녹내장으로 인한 시력 상실 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

정기적인 안과 검진을 받고 처방대로 매일 저녁에 **VYZULTA**를 사용하면 시력을 보호하는 데 도움이 됩니다.

처방된 대로 매일 VYZULTA를 사용하세요.

VYZULTA는 안압을 낮추는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 녹내장이나 안구고혈압을 관리하는 데 중요합니다. **지시된 대로 VYZULTA를 사용하면 치료 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.**

VYZULTA와 동등한 일반 의약품은 없습니다. **약국에서 다른 제품을 추천할 경우 그러한 제품은 VYZULTA와 동일하지 않습니다.** 약국에 재고가 없는 경우 도매점에 주문해 달라고 요청하세요.

눈이 충혈될까 걱정되시나요?

일부 녹내장 치료제는 눈의 충혈을 자주 유발하여 치료를 중단하게 만드는 경우가 있습니다.

임상 시험에서 **VYZULTA는 눈 충혈 발생률이 낮았고, 부작용으로 인해 사용을 중단한 환자는 1% 미만이었습니다.**

VYZULTA.com에서 자세히 알아보세요

QR 코드를 스캔하거나 **VYZULTA.com**을 방문하여 치료 성공, 리소스 및 비용 절감 제안에 대한 팁을 확인하세요.

중요 안전 정보(계속)

- 속눈썹의 길이 증가, 굵기, 색, 속눈썹 수 및/또는 속눈썹 성장 방향의 변화를 포함하여 속눈썹에 점진적인 변화가 일어날 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 양쪽 눈의 모양이 서로 달라질 수 있습니다. 이러한 변화는 대개 VYZULTA 치료를 중단하면 돌아옵니다.

중요 안전 정보(계속)

- 눈에 어떤 변화가 생기거나, 눈 질환이 생기거나, 시력에 갑작스러운 변화가 생기거나, 눈에 부작용이 생기거나, 눈 수술을 받은 경우에는 즉시 의사에게 알리십시오.
- VYZULTA를 눈에 넣기 전에 콘택트렌즈를 제거하세요. 15분 후에 렌즈를 다시 착용할 수 있습니다.

중요 안전 정보(계속)

- VYZULTA와 함께 다른 점안액을 사용하는 경우, 각 점안액을 사용하는 사이에 5분을 기다리십시오.

추가적인 중요 안전 정보를 본문에서 읽으시고 전체 처방 정보는 포켓에 있는 내용을 참조하세요.

Source segment	Translation	Back Translation
Contents	목차	Table of Contents
©2025 Bausch + Lomb.	©2025 Bausch + Lomb.	©2025 Bausch + Lomb.
VYZ.0044.USA.25	VYZ.0044.USA.25	VYZ.0044.USA.25
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	중요 안전 정보(계속)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONTINUED)
The most common side effects seen in studies were eye redness, eye irritation, eye pain, and pain after putting the drops in your eye.	연구에서 가장 흔하게 나타난 부작용은 눈의 충혈, 눈 자극, 눈의 통증, 눈에 점안액을 넣은 후의 통증이었습니다.	The most common side effects shown in studies were: eye redness, eye irritation, eye pain, and pain after putting the ophthalmic solution in the eyes.
You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA.	처방약의 부작용은 FDA에 신고해주시기 바랍니다.	Please report side effects of prescription drugs to the FDA.
Visit www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088	www.fda.gov/medwatch를 방문하거나 1-800-FDA-1088로 전화하십시오.	Visit www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088.
INDICATION	용도	Usage
VYZULTA® (latanoprostene bunod ophthalmic solution), 0.024%, is used to lower intraocular (eye) pressure in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension.	VYZULTA®(라타노프로스틴 부노드 점안액) 0.024%는 개방각녹내장 또는 안구고혈압 환자의 안압을 낮추는 데 사용됩니다.	VYZULTA® (latanoprostene bunod ophthalmic solution) 0.024% in reducing intraocular pressure in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension.
† Terms, conditions, and limitations apply.	† 이용 약관과 한도가 적용됩니다.	† Terms and conditions and limits apply.
Please see eligibility criteria and terms and conditions at BauschAccessProgram.com.	자격 기준과 이용 약관을 BauschAccessProgram.com에서 확인하세요.	Please verify the eligibility criteria/terms and conditions at BauschAccessProgram.com.
Eligible† commercially insured patients may pay as little as a $25 copay for up to a 90-day supply for first Rx and eligible refills.	적격† 상업 보험에 가입한 환자는 첫 번째 처방전 및 적격 리필에 대해 최대 90일분까지 최소 $25의 공동 부담금만 지불할 수 있습니다.	Eligibility† Patients who have purchased commercial insurance may pay only a minimum of a $25 copay, for up to a maximum portion of 90 days for the first prescription and eligible refills.
Exclusively at participating independent pharmacies.	이 금액은 참여하는 독립 약국에서만 적용됩니다.	This amount applies only at participating independent pharmacies.
At non-participating pharmacies, eligible commercial patients may pay as little as a $35 copay.	참여하지 않는 약국에서는 적격 상업 보험 환자가 최소 $35의 공동 부담금을 지불할 수 있습니다.	At nonparticipating pharmacies, eligible commercially insured patients may pay a minimum of a $35 copay.
Those who qualify for the "Extra Help" Program pay about $12 or less for VYZULTA	"Extra Help" 프로그램에 대한 자격이 있는 환자는 VYZULTA에 대해 약 $12 이하를	Patients who qualify for the "Extra Help" program pay approximately $12 or less in

	지불합니다	connection with VYZULTA
If you are enrolled in Medicare and Medicaid, you already qualify for the “Extra Help” Program	Medicare와 Medicaid에 등록되어 있는 경우 이미 "Extra Help" 프로그램에 대한 자격이 있는 것입니다	If you are enrolled in Medicare and Medicaid, you might already be eligible for the “Extra Help” program.
* Based on data from March 2025.	* 2025년 3월 데이터 기준.	* Based on March 2025 data.
Up to 76.7% of Medicare Part D patients may be covered.	최대 76.7%의 Medicare Part D 환자가 보장을 받을 수 있습니다.	A maximum of 76.7% of Medicare Part D patients may be covered.
VYZULTA is now covered for nearly 77%* of patients with Medicare prescription coverage	VYZULTA는 현재 Medicare 처방약 보장을 받는 환자의 약 77%*가 보장됩니다.	VYZULTA is currently covered by Medicare Prescription Drug Coverage. Approximately 77% of patients* are covered.
Have Medicare Part D?	Medicare Part D가 있습니까?	Do you have Medicare Part D?
TREATMENT JOURNEY SAVINGS	치료비 절약	Save on medical costs
Take control of your treatment journey	치료 과정을 스스로 통제 하세요	Take control of your treatment process
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	중요 안전 정보	Important Safety Information
Brown color, or increased brown color, of the iris can occur, which may be permanent.	홍채가 갈색으로 변하거나 갈색이 더 진해질 수 있으며, 이는 영구적일 수 있습니다.	Brown color, or increased brown color, of the iris may progress, and this may be permanent
Darkening of the eyelid skin may also occur, which is usually reversible after VYZULTA treatment is discontinued.	눈꺼풀 피부가 어두워지는 현상도 발생할 수 있으며, 대개 VYZULTA 치료를 중단하면 돌아옵니다.	Darkening of the eyelid skin may also occur, and generally is reversed after discontinuing VYZULTA treatment.
Please see additional Important Safety Information throughout and full Prescribing Information in pocket.	추가적인 중요 안전 정보를 본문에서 읽으시고 전체 처방 정보는 포켓에 있는 내용을 참조하세요.	Please read the additional Important Safety Information in the main body text, and reference the content of the full Prescribing Information in the pocket.
* See full Prescribing Information.	* 전체 처방 정보를 확인하세요.	* See full prescribing information.
YOUR VISION.	여러분의 시력.	Your eyesight.
YOUR VYZULTA.	여러분의 VYZULTA.	Your VYZULTA.
Lower your eye pressure from open-angle glaucoma or ocular hypertension	개방각녹내장 또는 안구고혈압으로 인한 안압을 낮추세요.	Reduce your lower intraocular pressure that results from open-angle glaucoma or ocular hypertension.
One Drop	하루 한번	One Drop
Once A Day*	한 방울*	Once A Day*
Not an actual patient.	실제 환자가 아닙니다.	This is not an actual patient.
KOREAN	KOREAN 한국어	KOREAN KOREAN
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont’d)	중요 안전 정보(계속)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONTINUED)

Avoid touching the tip of the container to the eye or any other surface, including a finger, in order to avoid contamination of the solution by bacteria.	용액이 박테리아에 오염되는 것을 방지하기 위해 용기 끝부분을 눈이나 손가락 등 다른 표면에 대지 않도록 하세요.	Do not touch the tip part of the container to the eyes or other surfaces, such as the fingers, to prevent the solution being contaminated by bacteria.
Serious damage to the eye and possible loss of vision may result from using contaminated solutions.	오염된 용액을 사용하면 눈에 심각한 손상을 입거나 시력을 잃을 수도 있습니다.	Using contaminated solutions may also cause serious damage to the eye or loss of vision.
Please see additional Important Safety Information throughout and full Prescribing Information in pocket.	추가적인 중요 안전 정보를 본문에서 읽으시고 전체 처방 정보는 포켓에 있는 내용을 참조하세요.	Please read the additional Important Safety Information in the main body text, and reference the content of the full Prescribing Information in the pocket.
What is ocular hypertension?	안구고혈압이란 무엇인가요?	What is “ocular hypertension”?
Ocular hypertension is when the fluid in your eye is not draining properly which causes the pressure in your eye to be higher than normal	안구고혈압은 눈의 체액이 제대로 배출되지 않아 눈의 압력이 정상보다 높아지는 현상입니다.	Ocular hypertension is when the pressure in the eye increases higher than normal, because the fluid in the eye does not drain properly.
There are no signs or symptoms for ocular hypertension, so people diagnosed with this condition should be monitored carefully by an eye doctor, as they may be at a higher risk of glaucoma	안구고혈압은 징후나 증상이 없기 때문에, 이 질환으로 진단받은 사람은 녹내장 위험이 더 높을 수 있으므로 안과 의사의 주의 깊은 모니터링을 받아야 합니다.	There are no signs or symptoms of ocular hypertension, therefore people who are diagnosed with this condition may be at a higher risk of glaucoma, and should seek the close monitoring of an ophthalmologist.
If left untreated, this may lead to a visual disability and, eventually, blindness.	치료하지 않고 방치할 경우 시각 장애로 이어지고 결국 실명에 이를 수도 있습니다.	If left untreated, this may also lead to visual impairment and blindness.
Central field vision loss	중심 시야 상실	Loss of central vision
Peripheral (side) vision loss	주변(측면) 시야 상실	Loss of peripheral (side) vision
As the condition worsens, people with glaucoma will slowly begin to lose peripheral (side) vision, while others may experience central field loss.	상태가 악화됨에 따라 녹내장 환자는 서서히 주변(측면) 시력을 잃기 시작하는 반면, 다른 환자는 중심 시야를 잃을 수 있습니다.	As the condition worsens, people with glaucoma gradually begin to lose peripheral (side) vision, while others may lose central vision.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont’d)	중요 안전 정보(계속)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONTINUED)
If you are using other eye drops in addition to VYZULTA, wait 5 minutes between using each type of eye drop.	VYZULTA와 함께 다른 점안액을 사용하는 경우, 각 점안액을 사용하는 사이에 5분을 기다리십시오.	If you are using other eye drops along with VYZULTA®, wait for an interval of five minutes between using each ophthalmic solution.
Please see additional Important Safety Information throughout and full Prescribing Information in pocket.	추가적인 중요 안전 정보를 본문에서 읽으시고 전체 처방 정보는 포켓에 있는	Please read the additional Important Safety Information in the main body text, and reference the content of the full

	내용을 참조하세요.	Prescribing Information in the pocket.
Learn more at VYZULTA.com	VYZULTA.com에서 자세히 알아보세요	Find out more at VYZULTA.com
Scan the QR code or visit VYZULTA.com for tips for treatment success, resources, and savings offers.	QR 코드를 스캔하거나 VYZULTA.com을 방문하여 치료 성공, 리소스 및 비용 절감 제안에 대한 팁을 확인하세요.	Scan the QR code or visit VYZULTA.com for tips on treatment success, resources and cost-saving suggestions.
Concerned about eye redness?	눈이 충혈될까 걱정되시나요?	Are you worried about your eyes getting bloodshot?
Some glaucoma treatments may cause high rates of eye redness, leading to discontinuation.	일부 녹내장 치료제는 눈의 충혈을 자주 유발하여 치료를 중단하게 만드는 경우가 있습니다.	Some glaucoma medications can cause frequent redness of the eyes, which may cause patients to discontinue treatment.
In clinical trials, VYZULTA had low rates of eye redness and <1% of patients stopped using it due to side effects.	임상 시험에서 VYZULTA는 눈 충혈 발생률이 낮았고, 부작용으로 인해 사용을 중단한 환자는 1% 미만이었습니다.	In clinical trials VYZULTA had a low incidence of eye redness, and less than 1% of patients discontinued use due to side effects.
Use VYZULTA daily as prescribed	처방된 대로 매일 VYZULTA를 사용하세요.	Use VYZULTA daily as prescribed.
VYZULTA may help lower your eye pressure, which is important in managing your glaucoma or ocular hypertension.	VYZULTA는 안압을 낮추는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 녹내장이나 안구고혈압을 관리하는 데 중요합니다.	VYZULTA may help lower intraocular pressure, which is important in managing glaucoma or ocular hypertension.
Using VYZULTA as directed may support your treatment goals.	지시된 대로 VYZULTA를 사용하면 치료 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.	Using VYZULTA as instructed can help you in achieving your treatment goals.
There is no generic equivalent for VYZULTA.	VYZULTA와 동등한 일반 의약품은 없습니다.	There are no generic drugs equivalent to VYZULTA.
If the pharmacy suggests a different product, it is not the same as VYZULTA.	약국에서 다른 제품을 추천할 경우 그러한 제품은 VYZULTA와 동일하지 않습니다.	If the pharmacy recommends other products, those products are not the same as VYZULTA.
If the pharmacy is out of stock, ask them to order it from the wholesaler.	약국에 재고가 없는 경우 도매점에 주문해 달라고 요청하세요.	If the pharmacy is out of stock, please request that it be ordered from the wholesaler.
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	중요 안전 정보(계속)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONTINUED)
Gradual changes to eyelashes may occur, including increased length, thickness, color, number of eyelashes and/or direction of eyelash growth.	속눈썹의 길이 증가, 굵기, 색, 속눈썹 수 및/또는 속눈썹 성장 방향의 변화를 포함하여 속눈썹에 점진적인 변화가 일어날 수 있습니다.	Gradual changes may occur in the eyelashes, including increases in length, thickness, color, number of eyelashes, and/or changes in the direction of eyelash growth.
These changes may result in a difference in appearance of each eye.	이러한 변화로 인해 양쪽 눈의 모양이 서로 달라질 수 있습니다.	The shape of each of the eyes may become different as a result of these changes.
These changes are usually reversible after	이러한 변화는 대개 VYZULTA 치료를	Usually, these changes are reversed when

VYZULTA treatment is discontinued.	중단하면 돌아옵니다.	discontinuing VYZULTA treatment.
Glaucoma is often called the silent thief of sight because it shows no symptoms until the damage is advanced.	녹내장은 손상이 진행될 때까지 증상이 나타나지 않기 때문에 종종 조용한 시력 도둑이라고 불립니다.	Glaucoma is often called the quiet vision thief because symptoms do not appear until the damage is advanced.
That's why early detection and regular eye exams are crucial to protecting your vision.	그렇기 때문에 조기 발견과 정기적인 시력 검사는 시력 보호에 매우 중요합니다.	This is the reason early detection and regular eye exams are so important when it comes to protecting your vision.
While glaucoma can't be cured or reversed, lowering eye pressure can help preserve sight.	녹내장은 치료하거나 되돌릴 수 없지만 안압을 낮추면 시력을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.	Glaucoma cannot be cured or reversed, but lowering eye pressure may help in maintaining vision.
What is open-angle glaucoma?	개방각녹내장이란 무엇인가요?	What is "open-angle glaucoma"?
Open-angle glaucoma is a disease that gradually causes vision loss and may lead to blindness	개방각녹내장은 점진적으로 시력을 상실하게 하는 질환으로 실명으로 이어질 수 있습니다.	Open-angle glaucoma is a disease that gradually causes vision loss and may lead to blindness.
It occurs when the fluid in one or both of your eyes does not drain properly	이 질환은 한쪽 또는 양쪽 눈의 체액이 제대로 배출되지 않을 때 발생합니다.	It occurs when the fluid in one or both of your eyes does not drain properly.
This increases the pressure in your eye, which may damage the optic nerve	이로 인해 눈의 압력이 증가하여 시신경이 손상될 수 있습니다.	As a result, this increases pressure in the eyes, and it may damage the optic nerve.
UNDERSTANDING EYE PRESSURE	안압 이해하기	Understanding Intraocular Pressure
IMPORTANT SAFETY INFORMATION (cont'd)	중요 안전 정보(계속)	IMPORTANT SAFETY INFORMATION (CONTINUED)
Tell your doctor immediately about any change in your eye, any eye condition that develops, any sudden change in your vision, any eye side effects, or if you have eye surgery.	눈에 어떤 변화가 생기거나, 눈 질환이 생기거나, 시력에 갑작스러운 변화가 생기거나, 눈에 부작용이 생기거나, 눈 수술을 받은 경우에는 즉시 의사에게 알리십시오.	Immediately inform your doctor if any changes occur in your eyes, any eye disease condition that develops, any sudden changes in your vision, any eye side effects that develop, or if you have received eye surgery.
Remove contact lenses before putting VYZULTA in your eyes.	VYZULTA를 눈에 넣기 전에 콘택트렌즈를 제거하세요.	Remove contact lenses before inserting VYZULTA in your eyes.
Lenses may be reinserted 15 minutes later.	15분 후에 렌즈를 다시 착용할 수 있습니다.	Lenses can be worn again after 15 minutes.
Keep up with regular eye appointments and use VYZULTA once daily in the evening as prescribed to help preserve your vision	정기적인 안과 검진을 받고 처방대로 매일 저녁에 VYZULTA를 사용하면 시력을 보호하는 데 도움이 됩니다.	Having regular eye exams and using VYZULTA every evening as prescribed will help protect your vision.
What is VYZULTA?	VYZULTA란 무엇인가요?	What is "VYZULTA"?
VYZULTA is a treatment drop that may help reduce eye pressure in people with open-	VYZULTA는 개방각녹내장이나 안구고혈압 환자의 안압을 낮추는 데 도움이 될 수 있는	VYZULTA is a treatment that may help lower intraocular pressure in patients with

angle glaucoma or ocular hypertension	치료제입니다.	open-angle glaucoma or ocular hypertension.
Lowering eye pressure can help reduce the risk of vision loss due to glaucoma	안압을 낮추면 녹내장으로 인한 시력 상실 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.	Lowering eye pressure may help reduce your risk of vision loss from glaucoma.
Not an actual patient.	실제 환자가 아닙니다.	This is not an actual patient.
Index	색인	Index